

BUNDESSORTENAMT
Osterfelddamm 80
D-30627 Hannover

Modell- und Demonstrationsvorhaben
"On-farm-Erhaltung von alten Gemüsesorten durch den Aufbau eines Netzwerkes"
(Förderkennzeichen: 2810BM001)

Beschreibung der
Wirsingsorte:

Gelba (IPK Nr. BRA 843)

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung - Genbank -
Corrensstraße 3
06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Rethmar des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2014

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/048/3 Final 16/02/2011.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1.3	Pflanze: Höhe	hoch	7	
2.3	Pflanze: maximaler Durchmesser (einschließlich Umblätter)	groß	7	
3	Pflanze: Länge des Außenstrunks	mittel bis lang	6	
4	Pflanze: Stellung der Umblätter	aufrecht	3	
5.3	Umblatt: Größe	mittel bis groß	6	
6	Umblatt: Form der Spreite	verkehrt eiförmig	5	
7	Umblatt: Profil der Spreitenoberseite	eben	2	
8.3	Umblatt: Stärke der Blasigkeit	mittel bis stark	6	
9.2	Umblatt: Größe der Blasen	klein	3	
10	Umblatt: Kräuselung	gering	3	
11	Umblatt: Farbe (mit Wachs)	blaugrün	4	
12	Umblatt: Intensität der Farbe	mittel	5	
14	Umblatt: Wachsschicht	mittel bis stark	6	
15	Umblatt: Wellung des Randes	stark	7	
16	Umblatt: Biegung des Randes	vorhanden	9	
17	Kopf: Form des Längsschnitts	breit elliptisch	4	
18	Kopf: Form der Basis im Längsschnitt	abgerundet	1	
19	Kopf: Länge	mittel	5	
20	Kopf: Durchmesser	klein	3	
21	Kopf: Position des maximalen Durchmessers	in der Mitte	2	
22	Kopf: Schluß	gedeckt	3	
23	Kopf: Blasigkeit des Deckblattes	gering bis mittel	4	
24	Kopf: Randbiegung des Deckblattes	vorhanden	9	
25	Kopf: Farbe des Deckblattes	graugrün	3	
26	Kopf: Intensität der Farbe des Deckblattes	hell bis mittel	4	
27	Kopf: Anthocyanfärbung des Deckblattes	fehlend oder sehr gering	1	
28	Kopf: Innenfarbe	gelblich	2	
30	Kopf: Dichte	dicht bis sehr dicht	8	

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
31	Kopf: Innenstruktur	mittel	5	
32	Kopf: Länge des Innenstrunkes im Verhältnis zur Länge des Kopfes	mittel bis lang	6	
33.3	Zeitpunkt der Erntereife	mittel	5	
34	Zeitpunkt des Platzens des Kopfes nach der Reife	sehr spät	9	