

**Modell- und Demonstrationsvorhaben**  
**"On-farm-Erhaltung von alten Gemüsesorten durch den Aufbau eines Netzwerkes"**  
 (Förderkennzeichen: 2810BM001)

Beschreibung der  
 Rettich-Sorte: **Dresdner Grauer (IPK Nr. RA 180)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung - Genbank -  
 Corrensstraße 3  
 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Hannover des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2014

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Internationalen Verbands zum Schutz von Pflanzenzüchtungen UPOV TG/63/6 1999-03-24.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Ploidie	-	-	nicht erfasst
2	Keimpflanze: Anthocyanfärbung des Hypokotyls	vorhanden	9	
3	Keimblatt: Form	herzförmig	1	
4	Keimblatt: Größe	klein bis mittel	4	
5	Laub: Anzahl der ausgewachsenen Blätter	gering bis mittel	4	
6	Blatt: Haltung	halbaufrecht	3	
7	Blatt: Länge	kurz	3	
8	Blattspreite: Form	schmal verkehrt eiförmig bis verkehrt eiförmig	2	
9	Blattspreite: Ton der grünen Farbe	fehlend	1	
10	Blattspreite: Intensität der Grünfärbung	mittel bis dunkel	6	
11	Blattspreite: Lappung (Teilung bis zur Mittelrippe)	vorhanden	9	
12	Blattspreite: Anzahl Lappen (wie unter 11)	gering bis mittel	4	
13	Blattspreite: Größe des Endlappens	mittel bis groß	6	
14	Blattspreite: Tiefe der Randeinschnitte	mittel	5	
15	Blattstiel: Anthocyanfärbung	vorhanden	9	
16	Rübe: Länge	kurz bis mittel	4	
17	Rübe: Dicke	sehr dick	8	
18	Rübe: Form	rund	2	
19	Rübe: Kopfform	abgerundet	2	
20	Rübe: Form der Basis	stumpf	3	
21	Rübe: Farbe der Haut	braun	3	
22	<u>Nur weiße Rettichsorten:</u> Rübe: Grünfärbung des Kopfes	fehlend oder sehr gering	1	
23	<u>Nur weiße Rettichsorten:</u> Rübe: Anthocyanfärbung	fehlend	1	
24	Rübe: Ringelung der Oberfläche	gering	3	
25	Rübe: Farbe des Fleisches	mattweiß	2	

<b>Nr.</b>	<b>Merkmal</b>	<b>Ausprägungsstufe</b>	<b>Note</b>	<b>Bemerkungen</b>
26	Zeitpunkt der Erntereife	mittel bis spät	6	
27	Rübe: Neigung zum Pelzigwerden	gering bis mittel	4	