

Modell- und Demonstrationsvorhaben
"On-farm-Erhaltung von alten Gemüsesorten durch den Aufbau eines Netzwerkes"
 (Förderkennzeichen: 2810BM001)

Beschreibung der Radieschen-Sorte: **French Golden (IPK Nr. RA 450)**

Herkunft des Saatguts: Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung - Genbank - Corrensstraße 3
 06466 Gatersleben

Anbauort: Prüfstelle Hannover des Bundessortenamtes

Anbaujahr: 2014

Die Beschreibung der Merkmalsausprägungen erfolgte in Anlehnung an das technische Protokoll des Gemeinschaftlichen Sortenamtes CPVO-TP/64/1 27/03/2002.

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
1	Ploidie	-	-	nicht erfasst
2	Keimpflanze: Anthocyanfärbung des Hypokotyls	vorhanden	9	
3	Keimblatt: Größe	groß bis sehr groß	8	
4	Laub: Breite des Ansatzes	schmal bis mittel	4	
5	Blatt: Haltung	halbaufrecht	3	
6	Blatt: Länge	sehr lang	8	
7	Blattspreite: Form	schmal verkehrt eiförmig bis verkehrt eiförmig	2	
8	Blattspreite: Form der Spitze	spitz	1	
9	Blattspreite: Ton der Grünfärbung	fehlend	1	
10	Blattspreite: Intensität der Grünfärbung	sehr hell	1	
11	Blattspreite: Anzahl Lappen	mittel bis groß	6	
12	Blattspreite: Randeinschnitte	vorhanden	9	
13	Blattspreite: Tiefe der Randeinschnitte	mittel bis tief	6	
14	Blattspreite: Behaarung	stark	7	
15	Blattstiel: Anthocyanfärbung	vorhanden	9	
16	Blattstiel: Stärke der Anthocyanfärbung	mittel	5	
17	Knolle: Dicke	dünn bis mittel	4	
18	Knolle: Dicke der Wurzel	dick	7	
19	Knolle: Form	schmal verkehrt dreieckig	8	
20	Knolle: Kopfform	konvex	3	
21	Knolle: Form der Basis	spitz	2	
22	Knolle: Farbe der Haut	einfarbig	1	
23	Knolle: Farbe des oberen Teils	gelb	5	
24	Knolle: Ausprägung der roten Farbe des oberen Teils	-	-	nicht anwendbar
25	<u>Nur Radieschen mit roter Farbe des oberen Teils:</u> Knolle: Intensität der roten Farbe des oberen Teils	-	-	nicht anwendbar

Nr.	Merkmal	Ausprägungsstufe	Note	Bemerkungen
26	Nur zweifarbiges Radieschen: Knolle: Ausdehnung des Weißanteils	-	-	nicht anwendbar
27	Knolle: Dicke der Rinde	mittel	5	
28	Knolle: Fleischfarbe	glasigweiß	1	
29	Zeitpunkt der Erntereife	mittel bis spät	6	
30	Knolle: Neigung zum Pelzigwerden	gering	3	